

傷寒論後條辨

傷寒論後條辨卷十三

一名直解

新安程應旼郊情條註

孫男士楚幼良

校

侄孫象恒次成

辨霍亂病脈證篇

六經之前有瘧濕喝以其病陽而脉則陰在傷寒
別為一病不嫌其為陰也六經之後有霍亂以其
病陰而證則陽在傷寒混為一病最惡其為陽也
名曰霍亂雖指病言然燭亂六經莫此為甚則亦
比之為瘧為鄭之意云乎

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利是名霍亂

增音霍亂
也子子聲
為外立聲
以增亂天
也

凡病至而能莫安治定者全藉中焦脾胃之氣爲之主。今則邪犯中焦卒然而起致令脾胃失其主持一任邪之揮霍嘔吐下利從其治處而擾亂之。是名霍亂。毋論受寒中暑及夾飲食之邪皆屬中氣乖張陰邪來侮變治爲亂之象。與傷寒毫無干涉。定亂先須正名也。

問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此爲何病。答曰此名霍亂。霍亂自吐下又利止復更發熱也。

霍亂之證僅見嘔吐而利誰不知責重中焦者而無如中虛受擾外氣輕亦失治病發熱頭痛身疼

惡寒。夾此吐利而來。表裏之間。倉卒摸不着頭腦。
故從屬定名。破本傷寒。不欲人以表惑裏也。且此
證不但有表寒可惑。更令人惑及表熱。以陰得陽
而利止。止復更發熱也。正宜從發熱處復盡其陽。
則嘔吐亦繼此得止。其寒其熱。總非外因。若不撤
去傷寒二字。臨證鮮有不誤者。

傷寒其脉微瀋者。本是霍亂。今是傷寒。却四五日至
陰經上。轉入陰必利。本嘔下利者。不可治也。欲似大
便而反失氣。仍不利者。此屬陽明也。便必鞭。十三日
愈。所以然者。經盡故也。

以證而論。仲莫非傷寒。須從脉法中辨之。方不至
以標亂本。微瀉者。胃陽虛而陰邪傷之診。本是霍
亂。並非傷寒。今人不從脉而從證。竟以爲是傷寒。
也是傷寒。則必作傷寒治。微陽初復。漫微其熱。四
五日至陰經上。陽轉入陰。必復利矣。以未止之脈。
加以新復之利。有陰無陽。遂成不治。則傷寒二字。
誤之也。如前以大便秘而反失氣。仍不秘。則從前所
復之陽。已歸入陰。無所復傳矣。其便秘。顧然其
愈也。雖下。歸入陰。却遲至十三日經盡。方得併盡。
其陰而愈。則仍是傷寒二字。以失氣而虛。其胃氣

阻○使○然○耳○然○便○雖○難○完○非○可○攻○之○陽○明○也○

下○利○後○當○便○難○難○則○能○食○者○愈○今○更○不○能○食○到○後○經○
中○頗○能○食○復○過○一○經○能○食○過○之○一○日○當○愈○不○愈○者○不○
屬○陽○明○也○

前○證○得○屬○陽○明○而○愈○已○為○饒○倖○而○饒○倖○中○尚○伏○危○
機○未○遂○晏○然○也○雖○便○難○必○能○食○方○是○胃○陽○得○復○其○
愈○也○方○為○真○愈○今○更○不○能○食○則○便○雖○難○而○熱○未○除○
愈○不○愈○未○可○知○也○更○須○驗○及○後○經○到○後○經○中○頗○能○
食○或○者○胃○陽○尚○在○熱○雖○未○除○不○妨○再○過○一○經○復○過○
一○經○能○食○過○於○前○則○吉○與○凶○判○於○此○一○日○矣○驟○多○

食則亦驟當愈。熱因能食而除。胃陽復也。此一日不愈。反能食而熱不止。則胃陽已經革職。屬陰中之能食。不屬陽明也。以萬物所歸之陽明不能統。屬利止之霍亂。究因變所由來。非本是霍亂之故。而今是傷寒之故。則雖十三日後。一過經而再過經。只是四。五日至陰經上轉入陰之大咎耳。從所正名。可不慎之於始歟。

霍亂頭痛發熱。身疼痛。多欲飲水者。五苓散主之。寒多不用水者。理中丸主之。

霍亂傷寒。不可成誤者。以其病屬正虛邪勝。陽微

陰。授。合。溫。經。散。寒。扶。陽。抑。陰。外。均。非。其。治。耳。自。其。初。證。言。之。雖。云。霍。亂。何。嘗。無。頭。痛。發。熱。身。疼。嘔。之。表。證。要。亦。分。寒。熱。而。治。裏。熱。多。欲。飲。水。者。五。苓。散。主。之。於。溫。經。殖。上。中。微。其。寒。水。寒。多。不。用。水。者。理。中。丸。主。之。一。意。溫。中。補。土。治。法。何。嘗。是。傷。寒。也。惡。寒。脉。微。而。復。利。利。止。亡。血。也。四。逆。加。人。參。湯。主。之。自。其。利。止。復。更。發。熱。證。言。之。惡。寒。脉。微。本。自。虛。寒。此。而。復。利。者。其。常。也。今。之。利。止。由。亡。血。之。故。所。以。更。復。發。熱。四。逆。加。人。參。湯。主。之。扶。陽。抑。陰。雖。亡。血。不。入。陰。寒。務。復。盡。真。陽。爲。主。豈。以。發。熱。是。傷。寒。也。

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

唯吐利俱止毫無霍亂證矣。雖是身痛不休方可從桂枝例。十和解其外。以其中有芍藥之寒。故猶當消息。猶曰小和。況吐利未止。四敢恣意於傷寒也。吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者。四逆湯主之。

至若吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者。幾同於少陰經陰中亡陽證矣。僅有四肢拘急一證。尚能戀住其陽。四逆湯而外無其主矣。尚敢以

發熱惡寒。三是傷寒。

既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脉微欲絕者。四逆湯主之。

此證較前更為孤陽欲脫之象。吐利有一。且虛亡陽。况既吐且利。而見此乎。四逆湯之治內寒。猶不勝其任。曾外熱是傷寒之外熱云。

吐已下斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脉微欲絕者。通脉四逆加猪膽汁湯主之。

不相見也。吐利未止。固宜回陽救陰為急急矣。即使吐已下斷。猶恐陰邪堅結。陽氣難伸。所以證則

汗出而厥。四肢拘急不解。脈則微而欲絕。通脈四逆加豬膽汁湯主之。於回陽急救中。交通其氣。善後猶難爲力。如此敢不愼厥初哉。

吐利發汗。脈平。小煩者。以新虛不勝穀氣故也。

吐利發汗。脈平。是經吐利愈後之證言。非此時尚有吐利也。陰邪退盡。陽回正復。乃有此象。猶以新虛不勝穀氣。而致小煩。則豈有今之穀氣不勝者。從前能勝其傷寒者哉。故仲景於前四條證。言之證。而以今是傷寒四字著戒。所戒不止於霍亂也。於後七條詳霍亂之治。而從本。是霍亂四字上。

法其法可變通於霍亂外也。其附霍亂於六經後者，殆亦三陽舉一不欲人以傷寒治傷寒之數言歟。卒病之來，未有不兼太陽一二證見。所謂表也。證雖見表，脈惡知表中不有裏氣爲之根因者。世人據表不察裏，輕易與以發散，裏氣一虛，脈乃變數而肌熱甚矣。不謂熱本于虛，更清其熱，陽不能回，假熱遂起。不知假熱由于中寒，展轉在傳經上訛亂至死，不悟此熱爲假熱，遂以假熱之證追而名之爲溫病，爲兩感。此等余目擊而心傷之者，不啻十百輩矣。終難誤于治熱，始實誤于治傷寒。

瘧

此亂之由也

孔子曰惡似而非爲其亂真也一部傷寒論全從防似上定法法不能處處設關防故於六經末列之前出一瘧濕貼作樣子曰傷寒所致太陽病宜應別論是全論中眼目見六經不有定屬也於六經既列之後出一霍亂作樣子曰傷寒其脉微瀉者本是霍亂今是傷寒是全論中眼目見傷寒難以混名也一前一後攔住六經在內有使其不得踰越之意緣傷寒爲人所靠者六經顧經似矣而證非證似矣而脈非非之能亂是者以傷寒真者

少。似者多耳。不爲非者亂。須從似處破破之之法。全在於脉。脉真方是真。證真輒防似。爲似爲亂。只看前後二樣子。則凡在六經有證有脉者。俱不難照。此以定關防。除非在六經外。有證無脉者。或不妨擬議而意治之。所以更出易病。差後勞復病。而以其餘示例也。

辨陰陽易病

傷寒陰陽易之爲病。其人身體重。少氣。少腹滿。裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胸。頭重不欲舉。眼中生花。膝脛拘急者。燒褫散主之。

無病人之氣爲正。爲清。病後人之氣。扶邪。扶陽。男
女交媾。以我清正之氣。換得彼邪濁之氣。而爲病。
名曰陰陽易。我氣下。離。彼氣上。進。三焦相潤。一皆
穢濁之邪。布塞經絡中。所以有諸見證。如條中所
云者。燒視散主之。緣彼邪之散布於我。締者。是屬
客淫之氣。自他有耀者也。物見原物。自交引而各
尋及歸。寢矣。故得小便利。陰頭腫而愈。所謂求之
於其屬之一法也。

辨差後勞復病

大病差後勞復者。枳寢梔子湯主之。若有宿食者。加

大黃如博碁子五六枚。

傷寒差已後，更發熱，小柴胡湯主之。脉浮者，以肝氣之脉沉寔者，以下解之。

大病差後，從腰以下有水氣者，牡蠣澤瀉散主之。

大病差後，喜唾，久不了了者，胃上有寒，當以丸藥溫之，宜理中丸。

傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐者，竹葉石膏湯主之。病邪既至，不可輒認爲寔，須防正氣因攻而虛，病邪已去，不可輒認爲虛，須防餘邪以補復集，故復出諸條，以示隨宜定治之意。大抵以正氣初復，不

客邪。干爲主。可吐則吐。枳寔梔子湯可主。不以新
差遺。膈上之煩也。可導而導。大黃如博碁子五六
枚。可加。不以新差。留胃中之結也。熱則解之。從小
柴胡并酌其汗下。不以新差。經絡之繫也。水則
決之。從牡蠣澤瀉散於五苓等。不以新差。客解隨
之。停也。至若胃寒喜嘔。則用理中丸。溫則宜緩。不
因差後而峻溫也。虛羸逆吐。則用竹葉石膏湯。緩
而兼清。不因差後而純補也。只此汗吐衄利。雖
六法。當可而施。須得除邪務盡之意。而後微陽可
護。少火得溫。凡屬差後之證。不過推此例以爲義。

酌非必以數證爲印定之證。數方爲印定之方。病入脉已解。而日暮微煩。以病新差。人強與殺脾胃氣尚弱。故令微煩。損穀則愈。

脉已解爲真解。猶有強殺微煩之咎。以此條之損穀則愈例之。則凡寒濕補瀉間。其可不知所擇。傳乎。而謂理脾胃爲醫家之王道。亦於此益信矣。差後氣虛運緩。細玩往往新差者。本不欲殺。而家人婦子勉強。以此益爲孝敬。欲益之而反損。何如不益之爲得乎。

傷寒論後條辯卷之十四 一名直解

新安程應旌郊倩條註

辯不可發汗病脉證

夫以爲疾病至急。倉卒尋求。按要者難得。故重集諸可與不可與方治。比之三陰三陽篇中。此易見也。又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可與中也。

以按要難得。重集諸可與不可與。豈非可與不可與。尤爲要中之要乎。只爲世人欲以汗吐下三法。昇傷寒而病涉三陰三陽中者。往往遺其茶毒。故

於篇終尤三致意焉。觀其所條。嚴於不可與。而可
與。僅在陪列。乃於陪列。更加申飭。無非一破世人
各承家技之也。不欲其以傷寒治傷寒也。所以汗
吐下法。分宜於春夏秋之三時。而偏缺于冬季。明
乎傷寒非止冬令之病。而此書非止爲冬令傷寒
而設。世之紛紛祖叔和者。欲求溫熱病爲傷寒論
補亡。則請於仲景所云大法。春夏宜汗。春宜吐。秋
宜下之末。先爲補及冬官之攻工。何如。

脉濡而弱。弱反在關。濡反在寸。微反在上。濇反在下。
微則陽氣不足。濇則無血。陽氣反微。中風汗出而反

躁煩。瀉則無血。厥而且寒。陽微發汗。躁不得眠。

汗下皆亡津液。液生於穀精。必須胃陽充足。斯得營衛兩強。方可任攻。故欲行汗下法。先顧關脈。為主。脈濡而弱。陽氣虛微之診也。弱在關。濡浮其數。舉按皆虛之謂。由是胃陽不復上布。則微反在寸。而爲陽氣不足。若中風汗出而反躁煩。其見證也。脾精更不下瀉。則瀉反在尺。而爲亡血。若厥而且寒。其見證也。平常陽微則惡寒。陰弱則躁熱。今於寸尺兩反之。蓋由脾胃虛而且冷。故上下陰陽氣血不復交通也。則雖上下兩見虛診。總以陽微。

懷者

字。該之。責在濡弱之關。故也。更復發汗。毒去。熱。陽亡而陰亦竭。驟不得眠之所由來也。

脈濡而弱。弱反在關。濡反在巔。弦反在上。微反在下。弦爲陽。遲微爲陰。寒上實下虛。意欲得溫。微弦爲虛。不可發汗。發汗則寒慄不能自還。

不但此也。關脈濡弱而胃陽衰甚。則弦反在上。而作陽弦。微反在下。而代陰寒。陽陷在上爲上實。此假實也。陰寒在下爲下虛。此真虛也。意欲得溫。從病人身上驗之。從溫則三焦各歸其部。而運自降。所以然者。微虛弦亦虛也。更發其汗。則寒慄不能。

自○陰○邪○上○留○陽○部○無○復○望○中○氣○之○能○運○轉○矣○
諸○脉○得○數○動○微○弱○者○不○可○發○汗○發○汗○則○大○便○難○腹○中○
乾○胃○燥○而○煩○其○形○相○像○根○本○異○源○

不○但○關○也○更○以○諸○脉○言○之○數○動○為○陽○診○似○可○發○汗○
然○其○數○動○也○却○兼○微○弱○而○見○則○表○似○實○而○裏○却○虛○
氣○似○有○餘○而○血○實○不○足○也○發○汗○以○奪○其○陰○液○則○大○
便○難○腹○中○乾○胃○燥○而○煩○有○似○於○轉○屬○陽○明○證○而○實○
非○陽○明○也○緣○未○汗○之○先○數○動○脉○形○相○像○於○表○實○故○
發○汗○之○後○便○難○證○形○亦○相○像○於○胃○實○究○其○根○本○實○
由○發○微○弱○之○汗○得○來○虛○與○實○之○源○頭○自○異○耳○

○厥脈不可發汗。發汗則聲亂咽嘶。舌萎。聲不得。續。
○從前不可發汗。以其脈非汗脈耳。不知卽屬汗脈。
尤須合證。如云脈陰陽俱緊者。麻黃湯主之。固知
汗脈無如於緊矣。然厥而緊者。少陰之緊。非太陽
之緊也。宜溫而反汗。則聲亂咽嘶。舌萎。聲不得。前
以腎脈入肺。循喉夾舌本故也。

動氣在右。不可發汗。發汗則衄而渴。心苦煩。飲卽吐
水。

動氣在左。不可發汗。發汗則頭出汗不止。筋傷肉羸。
動氣在上。不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。

動氣在下不可發汗發汗則無汗心中大煩背節疼
疼目運惡寒食則反吐穀不得前

藏氣不安其位故動經位中素有邪據本藏之氣
反在依附之間最易離經所恃莫定之者全賴環
中之胃氣爲之主發汗虛其胃氣則四藏失所養
反被位邪攻擊而各見離經之象病證雖有左右
上下之不同要其失於建中之義則一也

咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷
欲得勝時不能自還

汗劑爲陽施於陰經則逆咽中閉塞由少陰液少

傷寒論卷之六
腎氣不能上通也。發少陰汗，則下厥上竭，故見逆如此。

欬者則劇，數吐涎沫，咽中必乾，小便不利，心中餓煩，晡時而發，其形似瘧，有寒無熱，虛而寒慄，欬而發汗，蹇而苦滿，腹中復堅。

欬者則劇，言欬勢之頻數也。加以數吐涎沫，依稀肺痿之證，肺傷而液耗，氣逆而陽微，可知咽乾小便不利，心中餓煩，液耗使然。晡時而發，其形似瘧，有寒無熱，虛而寒慄，氣逆而陽微使然。諸證皆由於欬，則肺傷是其本也。更發汗以虛其陽，陽與氣

兩傷不復能溫及中下故踰而苦滿腹中復堅由清陽不下布濁陰從下填也

欬而小便利若失小便者不可發汗汗出則四肢厥逆冷

欬而小便利若失小便者金寒則水冷此寒可溫而不可汗發汗則陽亡而陰遂盛故四肢厥逆冷諸逆發汗病微者難差劇者言亂目眩者死命將難

諸逆屬少厥居多陰寒極矣發汗是重奪其陽雖有微劇不同皆關於死明乎陽爲人命之根也

傷寒頭痛、翕翕發熱、形像中風、常微汗出自啞者、下之益煩、心中懊憹如蠱、發汗則致痙、身強難屈伸、薰之則發黃、不得小便、久則發欬吐。

總之發汗爲表陽盛實而設、則不特陰寒大忌、而陽虛亦非所宜。如傷寒頭痛、翕翕發熱、形像中風、常微汗出自啞者、表證輒關乎裏、與中風之乾啞者畧不同。汗下薰灸俱犯重實之法、故均在所禁。求其治因、其殆歸功於固衛和營之桂枝湯耶。原汗之所禁、非虛則寒而虛寒之中、俱夾有可汗之表證。惑人所以太陽經中有桂枝加人參桂枝加

附子等湯不欲人疑桂枝爲表藥而主治之中少
加範圍即可救裏須於此悟及陰陽互根表裏合
一之理耳

辨可發汗證

大法春夏宜發汗

春夏宜發汗者發汗有助宣陽氣之功等於添夏
之發生長育者然窺其意亦責重在桂枝湯今人
竟視麻桂二湯作春夏之禁禁其轉於時證者由
其重於證例也

凡發汗欲令手足俱周時出似漿漿然一時間許

傳集諸後條辨
佳不可令如水淋漓。若病不解。當重發汗。汗多必亡陽。陽虛不得重發汗也。

當重發汗。卽太陽篇中可更發汗。宜桂枝湯之謂。上重字平聲。下重字上聲。下一似卽上文註解。凡服湯發汗。中病卽止。不必盡劑。

中病卽止。亦麻黃桂枝互舉之詞。示樽節於中字。所以嚴不中之禁也。

凡云可發汗。無湯者。丸散亦可用。要以汗出爲解。然不如湯隨證良驗。

丸散僅可從權。隨證則不如湯。世之守定套方者。

則亦尤散之類也。○諸條爲可汗者定例而猶復申明告誡。觀汗多亡陽。陽虛不可重發汗二語。仲景於陽之一字不啻如保赤子矣。

夫病脈浮大。同病者言。但便硬耳。設利者爲大逆。輒爲發汗。出而解。何以故。脈浮當以汗解。

表裏二字重在脈。裏在證。故出便硬一證以示例。欲人於脈上定逆從。庶不至以陽明誤太陽。故以脈浮大設利者爲大逆著戒。以浮當汗解著法。

下利後身疼痛。清便自調者。急當救表。宜桂枝湯發汗。

云救表矣。復云發汗。不欲以發汗二字。今麻黃湯。倍倍。固知太陽之在仲景。多是不可汗之太陽。

辯發汗後病證

發汗多。亡陽譫語者。不可下。與柴胡桂枝湯。和其營衛。以通津液。後自愈。

和營衛。通津液。乃救表之大題。且特出此一條。以示例。而該括固。曰後自愈。不欲人於汗下。開求速效也。亡陽譫語。此譫語。作鄭聲看。

辯不可吐脉證

本經九四證。已具太陽篇中。

辯可吐脉證

大法春宜吐

吐法從升有發陳之義故以春宜寓意

凡用吐湯中病即止不必盡劑也

吐以太上焦之邪上焦爲清陽之分吐之過劑則邪去而所傷者膈中之陽陽固不可不審惜也

病胃上諸實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎漉下利日十餘行其脉反遲寸口脉微滑此可吐之吐之利即止

宿食在上脘者當吐之

宗氣聚于胸。升降呼吸出焉。清陽之分。豈能容濁物。而滿。吐以宜之。使升降無碍。則條中之証。自無。若屬表邪傳入。無形而有形。則痞滿結胸。另有治法。均非所宜矣。

病人手足厥冷。脈乍結。以客氣在胸中。心下滿而煩。飲食不能食者。病在胸中。當吐之。

客氣在胸中。不必有形也。而亦從吐例者。以其脈結。則胸中自鬱之邪。不由表入。故可從高越之耳。辨不可下。病脈証。

脈濡而弱。弱反在關。濡反在顙。微反在上。清反在下。

微則陽氣不足。滿則無血。陽氣反微。中風汗出而反
躁煩。滿則亡血。厥而且寒。陽微不可下。下之則心下
痞。難。

一部書
神命脉全
在乎此

此與不可汗首條同。汗下均為亡陽。故也。誤汗亡
陽。分之陽。誤下亡陰。分之陽。無陽則陰微。而地氣
得以上居。故心下痞。○條中凡云反者。皆不應
見。而見之意。傷寒有此。便不可作傷寒治。故雖有
汗下證。便不可汗下矣。○全部論中。俱要體會此意。
脈濡而弱。弱反在關。濡反在顛。弦反在上。微反在下。
弦為陽。遲微為陰。寒上實下虛。意欲得溫。微弦為虛。

傷寒論後條類
虛者不可下也

不出逆證而止云虛者不可下。不欲人泥定濡弱。弦微之脈象。及在關上下之部位。凡遇虛邪。均不可從欲溫之一法。廣意及耳。

脈濡而弱。弱反在關。濡反在顛。浮反在上。數反在下。浮爲陽虛。數爲無血。浮爲虛。數爲熱。浮爲虛。自汗出而惡寒。數爲痛。振寒而慄。微弱在關。胸下爲急。喘汗而不得呼吸。呼吸之中。痛在於臍。振寒相搏。形如產狀。醫反下之。於今脈數發熱。狂走見鬼。心下爲痞。小便淋瀝。小腹甚鞭。小便則尿血也。

濡弱在關。知爲虛矣。而浮爲在表。數爲在府。虛而有熱。在於血分。是知少陽之裏。分容邪矣。經曰。有柴胡證。但見一證。便是不必悉具。况證候班班。尤在三禁之列者乎。誤下而未罷之表。因虛而盡陷入少陽之裏。分是爲血室受邪。故有脈數發熱。狂走見鬼諸見證耳。此云脈數。是并濡弱之關。浮脈之表。俱變數也。從此而推及於誤汗。其爲奪血。又不必言矣。

脈濡而緊。濡則衛氣微。緊則營中衆。陽微衛中風發。熱而惡寒。營緊胃氣冷。微嘔心內煩。醫爲有大熱。解

肌而發汗、亡陽虛煩躁、心下苦痞堅、表裏俱虛竭、卒
起而頭眩、客熱在皮膚、悵快不得眠、不知胃氣冷、緊
寒在關元、技巧無所施、汲水灌其身、客熱因時罷、極
裸而振寒、重被而覆之、汗出而冒顛、體惕而又振、小
便爲微難、寒氣因水發、清殺不容間、嘔變反腸出、顛
倒不得安、手足爲微逆、身冷而內煩、遲欲從後救、安
可復追還。

脉濡而緊、陽虛陰盛、故胃冷而四肢虛、陽於在表、在
上、其自胃而下至關元、則無非陰寒之所畜也、經
汗誤水、虛陽隨客熱消盡、次何可追救、中變反腹

出謂清穀夾穢不下行而上出也。○此條
可汗例見諸此者欲以此條之亡陽爲下條之亡
陰作對峙也。此條之不可汗互有不可下下條之
不可下亦互有不可汗意。

脉浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無血孤陽獨
下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而
大汗出法應衛家當微今反更實津液四射營竭血
盡乾煩而不得眠血薄肉消而成暴液腎復以毒藥
攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如污泥而死
無陰而孤陽下陰部倘得小便赤而難則胞中不

虛僅爲陽搏。陽未離。則陰得滯而未散。今反小便利。而大汗出。則衛氣更微矣。其反更實者。非衛陽之實。而客陽之實也。衛陽猶或抱陰。客陽則專於攻。除故津液四射。而爲小便利。爲大汗出。熱甚。猶陰。所以營竭血盡。乾煩而不得眠。血薄肉消。而成暴液。暴液云者。點滴皆火氣煎熬而出。猶民脂已竭。徒以暴征成賦也。毒藥攻胃。則土敗而四藏無生。下如污泥而死。所下非津液而藏氣也。

傷寒脉陰陽俱緊。惡寒發熱。則脉欲厥。厥者脉初來大。漸漸小。更來漸漸大。是其候也。如此者。惡寒甚者。

衄衄汗出喉中痛熱多者目赤脈多睛不慧醫復發
之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀熱
多者便膿血若熏之則身發黃若灸之則咽燥若小
便利者可救之小便難者爲危殆

脈陰陽俱緊惡寒發熱者表邪也脈欲厥者夾陰
脈也表證夾陰所以惡寒汗出而喉中痛腎脈循
喉故也熱多則連及厥陰故目赤脈多其睛不慧
則仍屬水藏虛也發之下之皆能傷藏若咽中傷
者兩目閉若便清穀者便膿血罔非少陰之見證
煎之身發黃者水枯而土燥也熨之則咽燥者腎

逆而被劫也。小便利者，腎汁尚澁，小便難者，已成枯魚之肆矣。故可救，不可救，卜諸此。

傷寒發熱，口中勃勃氣出，頭痛目黃，身不可制，貪水者，必嘔惡水者，厥。若下之，咽中生瘡。假令手足溫者，必下重，便膿血，頭滿目黃者，若下之，則兩目閉，貪水者，脉必厥，其聲啞，咽喉塞。若發汗，則戰慄，陰陽俱虛。惡水者，若下之，則裏冷不嗜食，大便完穀出。若發汗，則口中傷，舌上白胎煩躁，脉數實，不大便，六七日後必便血。若發汗，則小便自利也。

此溫證夾陰之病，故只發熱而無惡寒證，口中勃

氣出頭痛目黃。不可制。陽盛於表也。貪水者。但惡水者。以陰盛於裏也。下之。則生瘡。上逆之。則氣被溫。纏也。手足溫者。必下重。熱邪乘腎虛而陷入也。此口手足溫。則上句手足厥可知。貪水者。解。咽喉寒。寒熱交發而受閉也。發汗亡陽。溫雖去。而寒獨留。故戰慄。故曰陰陽俱虛。虛字作寒字看。惡水者。溫淺而寒深。故下之。則寒冷。不嗜食。大便完穀出。發汗。則口中傷。上白胎煩躁。陽虛而被陰。裏不寧於上也。脈數實。不大便。六七日後必便。血。腎液枯而逼及血也。若發汗。則小便自利也。此

絕筆、腎脫遺尿、似不必贅及死字矣。

微則爲欬、欬則吐涎下之、則欬止而利、利不
休、則胸中如蟲蟻、溺入則出、小便不利、而身
忽爲難、頸背相引、臂則不仁、極寒反汗出、身
冷若水、眼睛不慧、語言不休、而穀食多入、此爲
除中、口雖能言、舌不得前。

諸微亡陽、則其欬爲寒欬、雖屬肺因、却從厥陰
來、蓋寒之深者、吐涎其驗也、下之則傷及胃土、
因不休、利不休、則脫邪益恣矣、胸中如蟲蟻、溺
入則出、遂成欬、厥證小便不利者、肝氣絳、痰不

泄也。兩脇拘急者，寒木無陽，不復舒布也。盜息爲難，頸背相引者，金飲一氣而遭寒木之侮也。極寒反汗出，身冷若冰，眼睛不慧，語言不休者，水盛而火欲亡，遂見鄭聲也。除中之證，唯厥陰有之。寒深而胃陽被革也。口雖欲言，舌不能前，知心陽已竭。諸水瀆矣。緣寒莫深於厥陰，故厥陰者，唯肺、脾、先自寒，則一絛之陽，全恃胃母之溫暖。今更并奪其母，周身成冰冷之局，而四藏無生矣。此證不因有下之之証，以厥陰之邪爲寒燥故也。

脈數者，久數不止，止則邪結，正氣不能復，邪氣却結。

於藏故邪氣浮之與皮毛相得。脈數者不可下。下之必煩利不止。

數脈爲陽而在府。爲日雖多不可止也。止藥必寒。寒則截陽於府而邪結。故正氣不能復而遂結於藏。是爲虛陽下陷之證。故邪氣浮之與皮毛相得。脈數者此爲浮數。下浮數之脈必煩利不止。虛陽下陷此其驗也。

脈浮大應發汗。醫反下之此爲大逆。

浮大與脈浮而大差別。虛寔雖在表也。雖有裏證仍宜從表發汗。下之則爲大逆。

動氣在右不可下下之則津液竭咽燥鼻乾頭眩心悸也

動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲蹶

動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣誤下是爲犯藏左右上下隨其經氣而致病故禁同汗列

咽中閉塞者不可下。下之則上輕下重。水穀下下。以則欲跪。身急痛。下利日數十行。

腎邪上逆。故有咽中閉塞之證。下之則陽氣益虛。陰氣益盛。故有上輕下重。諸見證。

諸外實者不可下。下之則發微熱。亡脈厥者。當臍微熱。

諸外實者。先表後裏。自有成治。誤下則表邪內侵。故外熱微。而內厥深。陽陷陰分。脈不得出。故無脈。而當臍握熱。握者不移之謂。手可提也。

諸虛者不可下。下之則大渴。求水者易愈。惡水者難愈。

諸虛者陰精陽液必有一亡。下之則大渴求水者亡陰。惡水者亡陽。故有愈劇之分。觀此知仲景慮誤下之助陰甚于慮誤下之亡陰矣。

太陽病外證未解不可下。下之爲逆。未解較不解稍異。勢雖欲殺仍須俟之。

病欲吐者不可下。嘔多雖有陽明證不可攻之。

乾嘔多爲少陽半表裏。但有一證便戒攻矣。

夫陽病熱多者下之則輟。

陽病乃熱病之類。陰虛而津液少故表裏熱俱多。下之則胃中水竭其輟也非轉屬陽明之輟矣。

無陽陰強大便難者下之則必清穀腹滿

無陽陰強陰結病也大便秘難不可下下則腸虛
寒入故必清穀腹滿

傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不譫人熏之則喘不
得小便心腹滿下之則短氣小便難頭痛背強加溫
鍼則愈

此證近於溫家有熱無寒汗下溫鍼均禁

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革因
腸鳴者屬當歸四逆湯

下利脈大指下之後致逆而言虛字指未下時之

病源而言設脉浮華而下借脉借證以酌治何所
該者廣云脉浮華則非實大俱不可下之脉矣云
因爾腸鳴則非滿堅俱不可下之證矣不可下而
誤下只因有不更衣之證惑人故以當歸四逆湯
屬之除可下外其餘非虛閉即寒閉酌此一方知
中樞另有主之者諸承氣自却步不前矣
辯可下病脉證

大法秋宜下

物○至○秋○成○實○非○實○不○下○故○取○宜○於○此○

凡服下藥用湯勝丸中病即止不必盡劑

用湯勝丸貴活法也。中病卽止。示節制也。

下利三部脉皆平。按之心下硬者。急下之。宜大承氣湯。

平者。平而實也。從大字揭其上下。而總無高低之
柴。浮起三部皆然。其與寸浮關沉之病。利迫厥故
當下以大承氣湯。

下利脉遲而滑者。內實也。利未欲止。當下之。宜大承
氣湯。

遲而滑。滑在下而遲在上。知爲物阻之遲。非寒陰
之遲。故但下其所阻。則內實去而遲得進。利自止。

矣。

問曰：人病有宿食者，何以別之？師曰：寸口脉浮而大，按之反滿，尺中亦微而濇，故知有宿食。當下之，宜大承氣湯。

宿食一證，最難拘一。故此下詳及之。寸口浮大，類乎表脈。按之反濇，尺中亦微濇，寸尺不應而應在按，知中實之有阻矣。故下其宿食而愈。

下利不欲食者，以有宿食故也。當下之，宜大承氣湯。傷食惡食，故不欲食。與不能食者自別。下利有此更無別樣虛證，知非三陰之下利，而宿食之下利。

也。

下利差後。至其年月日復發者。以病不盡故也。當下之。宜大承氣湯。

下利差後。而餘邪棲於腸胃。迴折處者。未盡。是爲伏邪。凡得其候而伏者。仍應其候而伸。下則搜而盡之矣。

下利脈反滑。當有所去。下之乃愈。宜大承氣湯。滑爲實。故可行通因通用之法。

病腹中滿痛者。此爲實也。當下之。宜大承氣湯。病腹中滿痛。雖陰經可下。不必其爲陽明矣。

傷寒後脉沉沉者內寔也下解之宜大柴胡湯。
沉沉二字連讀按之重着而不肯浮又無微弦滑。
弱之五而兼雖陰脉可從陽斷矣改用大柴胡湯
者傷寒後故也。

脉變弦而遲者必心下鞅脉大而緊者陽中有陰也
可以下之宜大承氣湯。

脉變弦而遲心下鞅寒兼挾飲固非下脉然使
中舉大而按緊則非虛寒者比陽中有陰陰字指
實邪言可以下之乃從陽分而破其陰實之法終

傷寒論後條辨附方卷之十五

仲景一百一十三方。循論中所主治者。摘而名之也。然其間。差訛移易。為叔和所更張者。已不少。如桂枝二越婢一湯。及桂枝麻黃各半湯等類。是也。今特脩載之。以待考。不妨姑仍其舊。至于因方而加之以論。則自成無已。始愛禮存羊。併不敢以我意之所是。遂芟去其所非也。

桂枝湯

桂枝

三兩 去皮

芍藥

三兩 苦

甘草

二兩 炙

生姜

三兩 辛 溫

大棗

十二枚 甘 溫

右五味咬咀以

水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。服已。須臾。飲稀粥一升餘。以助藥力。溫覆令一時許。通身絳絳。微似有汗者。益佳。不可令如水流。滴。病必不除。若一服汗出。病差。停後服。不必盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服當小促其間。半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。乃服至二三劑。禁生冷。粘滑。肉。起。五辛。酒。酪。臭惡等物。

成無已曰。內經曰。辛甘發散。爲陽。桂枝湯。辛甘之

劑也。所以登散風邪。內經曰。風淫所勝。平以辛。以苦。甘以甘。緩之以酸。收之。是以桂枝為主。甘草為佐也。內經曰。風淫於內。以甘溫之。以辛散之。是以生薑大棗為使也。

桂枝加葛根湯 張原方訂定

桂枝 三兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

葛根 四兩

右

六味以水一斗。先煮葛根。減二升。去上沫。內諸藥。煮取二升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。

桂枝加厚朴杏子湯

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十箇去皮
尖餘依前法

桂枝加桂湯

於桂枝湯方內更加桂二兩共五兩餘依前法

桂枝加附子湯

於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片餘
依前法

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯

成無已曰與桂枝以解未盡之邪加芍藥生薑人

參以益不足之血

桂枝加芍藥湯

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘
依桂枝湯法

桂枝加大黃湯

桂枝

二兩 去皮

大黃

一兩

芍藥

六兩

生薑

二兩 切

甘草

一兩 炙

大棗

十二枚 擘

五

六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三

服

桂枝去芍藥湯

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法

桂枝去芍藥加附子湯

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破
八片餘依前法

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝三兩

甘草二兩

生薑三兩

牡蠣五兩

龍骨四兩

大棗十二兩

蜀漆二兩

右爲末以水一斗二升先煮

蜀漆減二升內諸藥復取三升去滓溫服一升

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝 一兩

甘草 二兩

牡蠣 二兩

龍骨 二兩

右為末以水五升煮取二升去滓

溫服八合日三服

成無已曰辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經

中之火邪龍骨牡蠣之澀以收斂浮越之正氣

桂枝甘草湯

桂枝 二兩

甘草 二兩

右二味以水一

升煮取一升去滓頓服

成無已曰桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾

而理中

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓

半斤
甘平

甘草

二兩
甘平

大棗

十五枚
甘平

桂枝

四兩
去皮

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓

減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三

服作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之

水上有珠子五六千顆相逐取用之

成無已曰茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大

棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之

無力取不助腎氣也

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

四兩 甘草

桂枝

二兩 去皮 辛熱

白朮

二兩 苦甘溫

甘草

二兩 多甘平

右四味以水六升煮取三升去

滓分溫三服

成無已曰陽不足者補之以甘。茯苓白朮主津液而益陽也。裏氣逆者散之以辛。桂枝甘草行陽散氣。

茯苓甘草湯

茯苓

二兩 甘草

桂枝

二兩 去皮 辛熱

生姜

二兩 切辛溫

甘草

一兩 炙甘平

右四味以水四升煮取二升去

滓分溫三服

成無已曰茯苓甘草之甘益津液而和衛桂枝生
薑之辛助陽氣而解表。

炙甘草湯

甘草

四兩炙

生姜

三兩切

桂枝

三兩去
皮辛熱

人參

二兩
甘溫

生地黃

二兩
甘溫

阿膠

二兩
溫甘

麥門冬

半升
心甘平

麻子仁

半升
甘平

大棗

十二枚
甘溫

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升

去滓內膠洋消盡溫服一升日三服一名復脈

湯

成無已曰補所以去弱人參甘草大棗之甘以補

半夏

三兩湯洗

細辛

三兩

右八味以水一斗

先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去

滓溫服一升

成無已曰寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝
甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎
氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾姜細辛半
夏之辛以行水氣而潤腎欬逆而喘則肺氣逆內
經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以
收逆氣而安肺

加減法

若微利者去麻黃加芫花如鷄子大熨令

赤色下利者不可攻其表。汗出必脹滿。麻黃發其
陽。水漬入胃。必作利。芫花下十二水。水去利自止。
若渴者去半夏加栝蒌根三兩。辛燥而苦潤。半夏
辛而燥。津液非渴者所宜。故去之。栝蒌味苦而生
津液。故加之。若澁者去麻黃加附子一枚。炮。經
曰。水得寒氣。冷必相射。其人氣微。加附子溫散水
寒。病人有寒。復發汗。胃中冷。必吐瀉。去麻黃惡發
汗。若小便不利。少腹脹。去麻黃加茯苓四兩。水
漬下焦不行。爲小便不利。小腹滿。麻黃發津液於
外。非所宜也。茯苓泄蓄水於下。加所當也。若喘

者去麻黃加杏仁半斤去皮尖金匱要略曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

桂枝麻黃各半湯

桂枝

一兩十六銖去皮

芍藥

生薑

切

甘草

炙

麻黃

各一兩去節

大棗

十枚

杏仁

二十四圓湯浸去皮尖及兩仁者

右七味以水五升先

煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合

去滓溫服

桂枝二麻黃一湯

桂枝一兩十銖 芍藥一兩六銖 麻黃十六銖

生薑一兩六銖切 杏仁十六個去皮尖 甘草一兩二銖炙

大棗五枚 右七味以水五升先煮麻黃一二

沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

再

桂枝二越婢一湯

桂枝去皮 芍藥 甘草各一兩

生薑一兩三銖切 大棗四枚 麻黃十八銖

石膏二十斤 右七味以水五升先煮麻

黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服

一升。本方當裁爲越婢湯。桂枝湯合飲一升。合爲一方。桂枝二越婢一。成無已曰。胃爲十二經之主。脾治水穀爲卑。故曰。婢內經曰。脾主爲胃行其津液。是湯所以謂之越婢者。以發越脾氣。通行津液外壅方。一名越脾湯。卽此義也。

桂枝去桂加茯苓白朮湯

於桂枝湯方內去桂枝。加茯苓白朮各二兩。餘依前法煎服。小便利則愈。

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃四兩去節 杏仁五十個 甘草二兩炙

石膏半斤碎綿裹 右四味以水七升先煮麻黃

減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一

升

成無已曰內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣偏於用風邪外甚故以純甘之劑發之

葛根湯

葛根四兩 麻黃二兩去節 桂二兩去皮

芍藥二兩酒洗 甘草二兩炙 生薑三兩切

大棗十二枚劈 右七味以水一斗先煮麻黃

葛根。減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服。一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。將息。及禁忌。

成無已曰。本草云。輕可去實。麻黃葛根之屬是也。此以中風表實。故加二物於桂枝湯中也。

葛根加半夏湯

葛根 四兩

麻黃 三兩去黃汁焙乾

生薑 三兩切

甘草 二兩炙 芍藥 二兩

桂枝 二兩去皮

大棗 十二枚 半夏 半斤洗

水。以水一斗。先煮葛根麻黃。減二升。去白沫。

內諸藥煮取三升去滓溫服一升。覆取微似汗。

葛根黃連黃芩湯

葛根 半斤

甘草 二兩 炙

黃芩 二兩 苦辛

黃連 三兩 苦寒

右四味以水八升先煮葛根減二

升入諸藥煮取二升去滓分溫再服。

成無已曰內經曰甘發散為陽表未解者散以葛

根甘草之甘苦以堅裏氣弱者空以黃連黃芩之

苦

麻黃升麻湯

麻黃 二兩 去

升麻 一兩 一

當歸 一兩 一

知母 苦寒

黃芩 苦寒

萎蕤 各十八
銖甘平

石膏 甘寒

白朮 甘溫

乾薑 辛熱

芍藥 酸平

天門冬 去心
甘平

桂枝 辛熱

茯苓 甘平

甘草 各六銖
甘平

右十四味以

水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取
三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡
汗出愈

成無已曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以甘平
之麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之
當歸桂枝之辛以散寒上熱者以苦泄之知母

芩之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮
之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍
藥之酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺
除熱

麻黃連轆赤小豆湯

麻黃

二兩去節甘溫

赤小豆

一升甘平

連轆

二兩連根也苦寒

杏仁

四十箇去皮尖甘溫

大棗

十二枚甘溫

生梓白皮

一升苦寒

生姜

二兩切辛溫

甘草

二兩炙甘平

以上八味以漆

水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服今日兩服

成無已曰。內經曰。濕上甚而熱。治以甘溫。佐以甘平。以汗為散。正此之謂也。又煎用潦水者。亦取其水味薄。則不助濕氣。

麻黃附子細辛湯

麻黃

二兩去節甘熱

細辛

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

辛熱

右三味。以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。內藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

成無已曰。內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。以辛潤之。麻黃之甘。以解少陰之寒。細辛附子之辛。以溫少陰之經。

麻黃附子甘草湯

麻黃二兩 去節

甘草二兩 炙

附子一枚 炮 去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

或無已日麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣

桂枝附子湯

桂枝四兩 去皮 辛 炙

附子三枚 炮 去皮 破八片 辛 炙

生薑一兩 切 辛 洗

甘草二兩 炙 甘 洗

大棗十二枚 炙 甘 洗

右五味以水六升煮取三升去滓分三服

成無已曰。風在表者。散以桂枝。甘草之辛甘。溫在經者。逐以附子之辛熱。葦漿辛甘。行營衛通津液。以和表也。

去桂枝加白朮湯

於此方內。去桂枝。加白朮四兩。餘依前法。成無已曰。桂發汗。走津液。此小便利。大便鞭。為津液不足。去桂加朮。

甘草附子湯

甘草二兩炙
附子二枚炮去
桂枝四兩炙
白朮二兩

右四味。以水六升。煮取三升。去

淨溫服一升日三服初服得微汗裁解能食止
出復煩者服五合恐一升多者宜服六七合為
妙。

成無已曰桂枝甘草之辛甘發散風邪而固衛附
子白朮之辛甘解濕氣而溫經。

桂枝人參湯

桂枝

四兩去
皮辛熱

甘草

四兩炙
甘平

白朮

三兩
甘平

人參

三兩
甘溫

乾薑

三兩
辛熱

右五味

以水二升

先煮四味

取五升內桂更煮取三升溫服一升

日再夜一服。

成無已曰。表未解者。辛以散之。裏不足者。甘以緩之。此以裏氣大虛。表裏不解。故加桂枝。甘草於理中湯也。

小柴胡湯

柴胡

半斤 苦

黃芩

三兩 寒

人參

三兩 溫

甘草

二兩 平

半夏

半升 洗

生薑

二兩 切 溫

大棗

十二枚 甘 溫

枳實

七枚 以水一斗二升煮取六

升

去滓再煎取三升溫服一升日三服

成無已曰。熱淫於內。以苦發之。柴胡黃芩之苦。以發傳邪之熱。裏不足者。以甘緩之。人參甘草之甘。

以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆辛以散之半
夏以除煩嘔邪半在表則營衛爭之辛甘解之姜
棗以和營衛

柴胡加桂枝湯

桂枝去皮

黃芩

人參各半

甘草炙一兩

半夏二合

芍藥一兩

大棗六枚

生薑半斤切

柴胡四兩

右

九味以水七升煮取三升去滓溫服

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡半斤

桂枝三兩去

乾姜三兩

括蕒枳

四兩 苦寒

黃芩

三兩 苦寒

牡蠣

三兩 鹹寒

甘草

二兩 炙 甘平

石七味

以水一斗二升煮取六

升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微

煩復服汗出便愈

成無已曰內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩
之苦以解發表之邪辛甘發散爲陽桂枝甘草之
辛甘以散在表之邪酸以收之牡蠣之鹹以消胸
脇之滿辛以潤之乾薑之辛以助陽虛之汗津液
不足而爲渴苦以堅之括蕒之苦以生津液

柴胡加芒硝湯

於小柴胡湯方內加芒硝六兩餘依前法服不解更服

柴胡加龍骨牡蠣湯

半夏

二合

大棗

六枚

柴胡

四兩

生薑

半兩

人參

半兩

龍骨

半兩

鉛丹

半兩

桂枝

半兩

茯苓

半兩

大黃

一兩

牡蠣

半兩

右十一味以水八

升煮取四升內大黃切如梹子更煮一二沸去

滓溫服一升

大柴胡湯

柴胡 半斤 甘平 黃芩 三兩 苦寒 芍藥 二兩 酸

半夏 半升 辛溫 洗 生薑 五兩 辛溫 切 枳實 四枚 苦寒

大棗 二枚 甘溫 大黃 二兩 苦寒 右七味以水一斗

二升煮取六升去滓再煎湯服一升日三服一

方不用大黃苦不加大黃恐不為大柴胡湯也

成無已曰柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥

之酸苦湯泄而快之辛者散也半夏之辛以散逆

氣辛甘和也薑棗之辛甘以和營衛

四逆散

甘草 炙甘 枳實 破水瀝 苦寒 柴胡 苦寒

芍藥酸寒

右四味各十分搗篩白飲和服方

寸七日三服

成無已曰內經曰熱滯於內佐以甘苦以散收之
以苦發之枳實甘草之甘苦以泄裏熱芍藥之酸
以收陰氣柴胡之苦以發表熱

加減法寒欬者加五味子乾薑各五分并主下痢肺
寒氣逆則欬五味子之酸收逆氣乾薑之辛散肺
寒并主下痢者肺與大腸為表裡上欬下痢治則
隨同心者加桂枝五分等者氣虛而不能通行
心下築築脈悸動也桂枝主也引導陽氣苦熱以

使小便不利者。加茯苓五分。茯苓味甘而淡。用
以滲泄。腹中痛者。加附子一枚。炮令枳裏虛。遇
邪則痛。加附子以補虛。泄利下重者。先以水五
升。煮薤白三升。煮取三升。去滓。以散方寸匕。內湯
中。煮取一升半。分溫再服。泄利下重者。氣滯也。加
薤白以泄氣滯。
論曰。四逆者。諸陽之本。陽氣不足。陰寒加之。陽氣
不相順接。是致手足不溫。而成四逆。此湯中。發陽
氣。走散陰寒。溫經暖肌。故以四逆名。此膏藥之大
劑也。四逆屬少陰。少陰者。腎也。腎肝位。是非大劑。

不能疑內經曰連而奇偶制大其服此之謂也

五苓散

猪苓

十八銖
皮廿平

澤瀉

一斤六銖
半酸鹹

茯苓

十八銖
甘淡

桂

半兩
辛熱

白朮

十八銖
甘平

右五味為末以

白飲和服方寸匕七多飲暖水汗出愈

成無已曰淡者一也口入一而為甘甘甚而反淡

甘緩而淡滲猪苓白朮茯苓二味之甘潤虛燥而

利津液酸味下泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘

發散為陽桂枝之辛且以利肌表

五苓散

文蛤

五兩

古一味為散以沸湯和

湯用五合

成無已曰。鹹走腎邪。可以勝水氣。

猪苓湯

猪苓

去步 甘平

茯苓

甘平

阿膠

甘平

滑石

碎 甘寒

澤瀉

甘鹹寒 各一兩

右五味以水四

升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱消溫服

七合日三服

成無已曰。甘甚而反淡。淡味滲泄為陽。猪苓茯苓之甘以行小便。鹹味湧泄為陰。澤瀉之鹹以泄

水滑利竅阿膠滑石之滑以利木道

牡蠣澤瀉散

牡蠣

酸平

澤瀉

酸寒

栝蒌根

苦寒

蜀漆

辛平

葶藶

苦寒

商陸根

辛酸寒

海藻

鹹寒洗去鹹已上各等分

右七味與搗下篩為散更

入白中治之白飲和服方寸七小便利止後服

日三服

成無已曰。鹹味湧泄。牡蠣澤瀉海藻之鹹。以泄水

氣內經曰。濕淫於內。平以苦佐以酸。辛以苦泄之。

蜀漆葶藶栝蒌商陸之酸。辛與苦以導濕。

大承氣湯

大黃

四兩 酒洗

厚朴

半斤 苦溫 炙去皮

枳實

五枚 炙

芒硝

三錢 炙

右四味以水一斗先煮二物服五

升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火

微一兩沸分溫再服得下餘勿服

成無已曰內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實

之苦以潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴

之苦下結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之寒

以攻蘊熱

小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩炙
去皮

枳實

三枚
炙

已

上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

成無已曰大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大其故於大承氣湯去芒硝又以結不至堅故亦減厚朴枳實也

調胃承氣湯

大黃

二兩清酒
洗去灰

甘草

二兩炙
甘草

芒硝

半斤
苦大寒

右三味

以水三升煮取一升去滓內芒硝

更上火微煮令沸。少少溫服。
成無已日熱淫於內。治以酸寒。佐以苦甘。芒硝鹹
寒以除熱。大黃苦寒以瀉實。甘草甘平助二物推
而緩中。

麻仁丸

麻子仁

二升

芍藥

半斤

大黃

一斤去

厚朴

一斤炙去

枳實

半斤炙

杏仁

一斤去皮

脂甘

右六味為末。煉蜜為丸。桐子大。飲服十

丸。日三服。漸加以和為度。

成無已曰。內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。麻子杏

仁之甘緩脾而潤燥。津液不足以酸收之。芍藥之酸以飲津液。腸燥胃強以苦泄之。枳實厚朴大黃之苦下燥結而泄胃強也。

蜜煎導方

蜜七合。一味。內銅器中。微火煎之。稍凝。飴狀。攤之。勿令焦。着飲可丸。餅。手捻作挺。令頭銳大如指。長二寸許。當熱時急作。冷則硬。以內穀道中。以手急抱。欲大便時乃去之。

猪膽汁方

大猪膽一枚。瀉汁。和醋少許。以灌穀道中。如一

食頃當大便出

二白散

桔梗

三分辛苦微溫

巴豆

一分去皮心煮黑研如脂平溫

貝母

三分辛苦平

右件

三味

爲末

內巴豆

更於日

中

有之

以白飲

和服

強人

半錢

麤者

裁之

病在

膈上

必吐

在膈下

必利

不利

進熱

粥一杯

利過

不止

進冷

粥一盞

身熱

皮粟

不解

欲引

衣自

覆

者

若以

水噉

之洗

之

益令

熱却

不得

出當

汗而

不汗

則煩

假令

汗出

已

腹中

痛與

芍藥

三兩

如

上法

上法

成無已曰辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下
氣巴豆之辛用以散實

茵陳蒿湯

茵陳蒿

六兩苦
微寒

梔子

十四枚
勞苦寒

大黃

二兩去
皮苦寒

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮
取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁
狀色正赤一宿復減黃從小便去也

成無已曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以反
之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜瀉
必以酸大黃之苦寒以下瘀熱

十棗湯

芫花

苦寒

甘遂

苦寒

大戟

苦寒

大棗

甘平

右三味等分各別搗爲散以

水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內

藥末強人服一錢七歲人服半錢溫服之平旦

服若下少病不除者明日更服加半錢得快下

利後糜粥自養

成無已曰辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之

甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之

味也大棗之甘者益土而勝水

大陷胸湯

大黃

六兩去
皮苦寒

芒硝

一斤
鹹寒

甘遂

一錢
苦寒

石

三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝

煮一兩沸內甘遂末服一升得快利止後服

成無已曰大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名硝

石以其鹹能與粳米間有遂以通水也甘遂若失

間之遂其氣可以直達透結陷胸三物為丸

大陷胸丸

大黃

半斤
苦寒

葶藶

半斤
苦寒

芒硝

半斤
鹹寒

杏仁

半斤去皮
苦仁

右四味搗篩二味內杏仁

芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚明搗碎
末一錢七白蜜二合水二升煮取一升溫頓服
之一宿乃下更服取下為效禁如藥法
成無已曰大黃芒硝之苦熱所以熱苾蓆杏仁
之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利
皆以下泄積實物也

小陷胸湯

黃連

一兩
苦寒

半夏

半升
辛溫

枳實

大者一
個苦寒

右三味以水六升先煮枳實取三升去滓內諸
藥煮取二升去滓分溫三服

成無已曰苦以泄之辛以散之黃連枳實苦寒以泄熱半夏之辛以散結

枳核承氣湯

枳仁

三十個去

桂枝

二兩去

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩

右五味以水七升

煮取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先

食溫服五合日三服當微利

成無已曰甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下焦瘀血以桂枝辛熱之氣寒以散之熱其搏血故加二物於調胃承氣湯中也

抵當湯

水蛭

三十個鹹苦寒

蟅蟲

三十個鹹苦寒

桃仁

三十個苦甘平

大黃

三兩浸苦寒

右四味為末以

水五升煮取三升去滓溫服一升不下再服

成無已曰苦走血。鹹勝血。蟅蟲水蛭之鹹苦以除

畜血甘緩結。苦泄熱。桃仁大黃之苦以下結熱。

抵當丸

水蛭

二十個苦寒

蟅蟲

二十五個苦微寒

桃仁

二十個去皮尖

大黃

三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮

一丸取七合服之。時時當下血。若不下者連服。

瓜蒂散

瓜蒂一分黃苦寒

赤小豆一分酸溫

右二味各別搗

篩爲散已合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快利乃止

成無已曰其高者因而越之越以瓜蒂豆豉之苦在上者湧之湧以赤小豆之酸內經白酸苦湧泄爲陰

梔子豉湯

梔子

十二枚擘苦寒

香豉

四兩兩綿裹苦寒

右二味以水四

升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓
分爲二服溫進一服得吐者止後服

成無已曰酸苦湧泄爲陰苦以湧吐寒以勝熱梔
子豉湯相合吐劑宜矣

梔子甘草豉湯

於梔子豉湯方內加入甘草二兩餘依前法得
吐止後服

梔子生姜豉湯

於梔子豉湯方內加入生薑五兩餘依前法得
吐止後服

梔子厚朴湯

梔子

十四枚 苦寒

厚朴

四兩 苦寒

枳實

四枚 水浸 去穢炒苦

寒

已上三味以水二升半煮取一升半去滓

分二服溫進一服得吐者止後服

成無已曰酸苦湧泄梔子之苦以湧虛煩厚朴枳實之苦以泄腹滿

梔子乾薑湯

梔子

十四枚 勞苦寒

乾薑

二兩 辛熱

右二味以水三升

半煮取一升半去滓分三服溫進一服得吐者

止後服

成無已曰。苦以湧之。梔子之苦。以吐煩。辛以潤之。乾薑之辛。以益氣。

枳實梔子豉湯

枳實

三枚炙苦寒

梔子

十四枚擘苦寒

豉

一升綿裹苦寒

右

三味以清漿水七升。空煮取四升。內枳實梔子。煮取三升。下豉更煮五六沸。去滓。溫分再服。覆令微似汗。

成無已曰。枳實梔子豉湯。則應吐劑。此云覆令微似汗出者。以其熱聚於上。苦則吐之。熱散於表者。甜苦則發之。內經曰。火淫所勝。以苦發之。此之謂也。

梔子漿皮湯

梔子一十五

甘草一兩

黃櫨二兩右三味

以水四升煮取一升半去渣分溫再服

半夏瀉心湯

半夏半升洗

黃芩苦寒

乾薑辛熱

人參甘溫已上

黃連苦寒

大棗十二枚

甘草三兩炙

右七味以水一斗煮取六升去

滓再煮取三升溫服一升日三服

成無已曰辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦

入心而泄熱黃芩黃連之苦以瀉痞熱脾欲緩急

食甘以緩之人參大棗之甘以緩之

大黃黃連瀉心湯

大黃

二兩 苦寒

黃連

一兩 苦寒

右二味以麻沸

湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

成無已曰內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱

附子瀉心湯

大黃

二兩

黃連

黃芩

各一兩

附子

一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯

二升漬之須臾煮去滓內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯

生薑

四兩切

甘草

三兩炙

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚

右八味以水一

斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三

服

甘草瀉心湯

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾姜

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右

六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升
服一升日三服

黃芩湯

黃芩

三兩
苦寒

甘草

二兩
炙
甘平

芍藥

二兩
酸平

大棗

十二枚
甘溫

右四味以水一斗煮取三升去

渣溫服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升

生薑三兩

成無已曰虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩
芍藥之苦酸以堅飲腸胃之氣弱而不足者甘以
補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

黃芩加半夏生薑湯

於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘依

黃芩湯服法

黃連湯

黃連

苦寒

甘草

炙甘

乾薑

辛熱

桂枝

去皮辛熱

人參

甘平

半夏

辛溫

洗

大棗

十二枚

右七味

以水

一斗

煮取

六升

去

滓

湯服一升

日服

夜二服

成無已

曰

上熱者

泄之以

苦黃連

之苦

以降

陽下

寒者

散之以

辛桂枝

半夏

夏之

辛以

升陰

即欲

緩急

寒者

食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑

三兩 去皮

黃連

三兩 去須

黃芩

三兩 苦寒

人參

三兩 甘溫

右四味以水六升煮取二升去滓

分溫再服

成無已曰辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

黃連阿膠湯

黃連

四兩 苦寒

黃芩

一兩 苦寒

芍藥

二兩 酸平

雞子黃

二枚 甘溫

阿膠

三兩 甘溫

右五味以水五升

先煮三物取二升去滓內膠洋燂盡小冷內雞
子黃攪令相得溫服七合日三服
成無已曰陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除
熱陰不足以甘補之雞黃阿膠之甘以補血酸收
也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

白頭翁湯

白頭翁

三兩
苦寒

黃連

三兩
苦寒

黃柏

三兩
苦寒

秦皮

三兩
苦寒

右四味以水七升煮取二升去滓

溫服

一升不愈更服一升

成無已曰內經曰腎欲堅急食苦以堅之寒則下

焦虛是以純苦之劑堅之

竹葉石膏湯

竹葉 二把 辛平

石膏 一斤 甘寒

半夏 半升 洗 辛溫

人參 三兩 甘溫

甘草 二兩 炙 甘平

梗米 半升 甘微寒

麥門冬 一升 去心 甘平

右七味以水一斗煮取六升

去滓內梗米煮米熟湯成去米溫服一升日三

服

成無已曰。辛甘發散而除熱。竹葉石膏甘草之甘。辛以發散餘熱。甘緩脾而益氣。麥門冬人參梗米之甘以補不足。辛者散也。氣逆者欲其散。半夏之

辛以散逆氣

白虎湯

知母

六兩 苦寒

石膏

一斤 碎 甘寒

甘草

二兩 甘平

粳米

六合 甘平

右四味

以水一斗煮米熟湯成去

滓溫服一升日三服

成無已曰

熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘

以散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益

氣

白虎加人參湯

即於前方內加人參餘依白虎湯方法

四逆湯

甘草 二兩炙
甘平

乾姜 一兩半
辛熱

附子 一枚生用
去皮破八

片辛
大熱

右三味，咬咀，以水三升，煮取一升二合。

去滓，溫服，再服。強人可附子一枚，乾姜三兩。

成無已曰：內經曰：寒淫於內，治以甘熱。又曰：寒淫

所勝，平以辛熱。甘草、乾姜相合，為甘辛大熱之劑。

乃可發散陰陽之氣。

茯苓四逆湯

茯苓 六兩
甘平

人參 一兩
甘溫

甘草 二兩炙
甘平

乾姜 一兩半
辛熱

附子 一枚生用
去皮

右五味

以水五升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。
成無已曰。四逆湯以補陽。加茯苓。人參。以益陰。

四逆加人參湯

卽四逆湯加人參。

成無已曰。惡寒。脈微而利者。陽虛陰勝也。利止則
津液內竭。故云亡血。金匱玉函曰。水竭則無血。與
四逆湯。溫經助陽。加人參。生津益血。

通脈四逆湯

甘草

三兩

附子

大者一枚。生用。去皮。破人片。

乾薑

三兩。強人可四兩。

右三味。以水三升。煮取一升。

二合去滓分溫再服

加減法 面色赤者加蔥九莖。蔥味辛以通陽氣。
腹中痛者去蔥加芍藥二兩。芍藥之酸通寒利腹
中痛。爲氣不通也。嘔者加半夏二兩。辛以散之。
嘔爲氣不散也。咽痛者去芍藥加桔梗一兩。咽
中如結加桔梗則能散之。利止脈不出者去枳
梗加人參一兩。利止脈不出者亡血也。加人參以
補之。經曰脈微而利亡血也。四逆加人參湯主之。
脈病皆與方相應者乃可服之。

四逆加豬膽汁湯

於四逆湯方內加入猪膽汁半合。餘依前法用。如無猪膽以羊膽代之。

白通湯

葱白四莖 辛 溫

乾薑一兩 辛 熱

附子一枚 生用 去皮破入

片辛 熱

右三味以水三升煮取一升去滓分服

再服

成無已曰內經曰腎苦燥急食辛以潤之。葱白之辛以通陽氣。乾薑附子之辛以散陰寒。

白通加猪膽汁湯

葱白四莖

乾薑一兩

附子一枚 生用 去皮破入片

入尿

五合 鹹寒

猪膽汁

一合 苦寒

已上三味以水

三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分

溫再服若無膽亦可用

成無已曰內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不逆而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦寒物於自通湯熱劑中要其氣相從則可以去格拒之寒也

附子湯

附子

二枚去 皮辛熱

茯苓

三兩 甘平

人參

二兩 甘溫

白朮四兩 芍藥三兩 右五味以水八升
 煮取三升去滓溫服一升日三服辛以散之附
 子之辛以散寒甘以補之茯苓人參白朮之甘
 以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以厥者
 偏陰偏陽則為痢火欲寔水當平之不微偏勝
 也

芍藥甘草明子湯

芍藥三兩 甘草三兩 附子一枚炮去皮破八片
 已上三味以水五升煮取一升五合去滓
 分溫服

成無已曰芍藥之酸收斂津液而益營附子之辛
溫固陽氣而補衛甘草之甘調和辛酸而安正氣
乾薑附子湯

乾薑辛熱

附子一枚生用去皮破八片辛熱

右二味

以水三升煮取一升去滓頓服

成無已曰內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒大甚
是以辛熱劑勝之也

真武湯

茯苓甘草三兩

芍藥三兩酸平

生薑三兩切辛溫

白朮二兩甘溫

附子一枚炮去皮破八片辛熱

右五味以

水入升煮取三升去滓溫服七合日三服。
成無已曰脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益
脾逐水寒濕所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平
附子芍藥生薑之酸辛以溫經散濕。

加減法。若欬者加五味半升細辛乾姜各一兩氣
逆欬者五味之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛
乾薑之辛以散水寒。若小便利者去茯苓小便
利則無伏水故去茯苓。若下利者去芍藥加乾
薑二兩芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒。若嘔者
去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子補氣。

生薑散氣于金曰。聖家多服生薑。此為聖家聖藥。
理中湯并丸

人參

甘草

白朮

乾薑

辛熱已上
各三兩

右四味搗篩為末。蜜和丸如

雞黃大。以沸湯數合。和一丸。研碎。溫服之。日三
服。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯
法以四物依兩數。切。用水八升。煮取三升。去滓。
溫服一升。日三服。

成無已曰。脾欲緩。急食甘以緩之。用甘補之人參。
白朮。甘草之甘。以緩脾氣。調中寒淫所勝。平以辛。

熱乾姜之辛以溫胃散寒

加減法

若膈上築者腎氣動也去朮加桂四兩脾

虛腎氣動者膈上築動內經曰甘者令人中滿朮

甘壅補桂泄奔豚是相易也吐多者去朮加生

薑三兩嘔家不喜甘故去朮嘔家多服生薑以辛

散之下多者運用朮滑者加茯苓二兩下多

者用朮以去濕悸加茯苓以導氣渴欲得水者

加木足前成四兩半津液不足則渴木甘以緩之

腹中痛者加人參足前成四兩半裏虛則痛加

人參以補之寒者加乾姜足前成四兩半寒淫

所勝平以辛熱。腹滿者去木加附子一枚。照湯後如食頃飲熱粥一升許。微自溫勿發揭衣。虛則氣墜。腹滿甘令人中滿。是太水也。附子之辛以補陽散壅。

甘草乾薑湯

甘草日兩炙

乾薑二兩炮

右咬咀以水三

升煮取一升五合去滓分溫再服。

成無已曰辛甘發散為陽。甘草乾薑相合以發陽氣。

烏梅丸

烏梅 三百個 酸溫

細辛 六兩 辛熱

乾薑 十兩 辛熱

黃連 一斤 苦寒

當歸 四兩 辛溫

附子 六兩 辛熱

蜀椒 四兩 辛熱

桂枝 六兩 辛溫

人參 六兩 甘溫

黃柏 六兩 苦寒

右十味 異搗篩 合治之 以苦酒漬

烏梅一宿 去核 蒸之 五升米下 飯熟 搗成泥 和

藥令相得 內臼中 與蜜 杵二千下 團如梧桐子

大先食 飲服十圓 日三服 稍加至二十圓 禁生

冷滑物 貝食等

成無已曰 肺主氣 肺欲收 急食酸以收之 烏梅之酸 以收肺氣 脾欲緩 急食甘以緩之 人參之甘 以

緩脾氣。寒淫於內。以辛潤之。以苦堅之。當歸桂
細辛之辛。以潤內寒。寒淫所勝。平以辛熱。薑附之
辛熱。以勝寒。虢得甘則動。得苦則安。黃連黃柏之
苦。以安虢。

吳茱萸湯

吳茱萸

一升洗
辛熱

人參

三兩
甘溫

生薑

六兩切
辛溫

大棗

十二枚
甘溫

右四味。以水七升。煮取二升。去

滓。溫服七合。日三服。

成無己曰。內經曰。寒淫於內。治以甘熱。佐以苦辛。

吳茱萸生薑之辛。以溫胃。人參大棗之甘。以緩脾。

當歸四逆湯

當歸 辛溫

桂枝 辛溫

芍藥 酸寒

細辛 辛溫

大棗 甘溫

甘草 甘溫

通草 甘平

右七味以水八升煮取三升去滓

溫服一升日三服

成無已曰內經曰脉者血之府也諸血者皆屬心通脉者必先補心蓋血若先入心當歸之苦以助心血心若緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝若急急食甘以緩之大棗甘草補草之甘以緩陰血

四逆加吳茱萸生薑湯

即前方加吳茱萸二升生薑半斤切以水六升清酒二升和煮取五升去滓溫分五服一方水酒各四升

成無已曰。茱萸辛溫以散久寒。生薑辛溫以行陽氣。

桃花湯

赤石脂一斤一半全用

乾姜一斤

粳米一升

右三味以水七升煮粳米令熟去滓

離脂七合內赤石脂末方寸七日三服若一

意勿服

成無已曰。清可去脫。赤石脂之清。以固腸胃。辛以散之。乾薑之辛。以散裏寒。粳米之甘。以補正氣。

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂一片碎 禹餘糧一片碎

已上二味以

水六升。煮取二升。去滓。三服。

本草云。澁可去脫。石脂之澁。以收斂之。重可去僞。餘糧之重。以鎮固之。

旋覆代赭石湯

旋覆花一斤 代赭石二斤

生薑五兩切

半夏

半升洗
辛溫

代赭石

一兩
若寒

大棗

十二枚
辛溫

甘草

三兩炙
甘平

右件七品

以水一斗煮取六升

去滓再煎取三升溫服一升日三服

成無已曰。鞭則氣堅。鹹味可以與之。旋覆之鹹以
與。痞鞭。虛則氣浮。重劑可以鎮之。代赭石之重以
鎮。虛逆。辛者散也。生薑半夏之辛以散。虛痞甘者
緩也。人參大棗甘草大棗之甘以補胃弱。

厚朴生薑甘草半夏人參湯

厚朴

半斤去皮
炙苦溫

生薑

半斤切
辛溫

半夏

半斤洗
辛平

人參

一兩
甘溫

甘草

二兩炙
甘平

右五味以水一

斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。
成無已曰。脾欲緩。急食甘以緩之。用苦泄之。厚朴
之苦。以泄腹滿。人參甘草之甘。以益脾胃。半夏生
薑之辛。以散滯氣。

芍藥甘草湯

白芍藥

四兩 微寒 酸

甘草

四兩 平 甘

右二味。咀。以

水三升。煮取一升半。去滓。分溫再服之。

成無已曰。芍藥白補而赤瀉。白收而赤散也。酸以
收之。甘以緩之。酸甘相合。用補陰血。

甘草湯

甘草二兩 右一味以水三升煮取一升半分
滓溫服七合日一服

桔梗湯

桔梗

一兩半
甘微溫

甘草

二兩
甘平

右二味以水三升

煮取一升去滓溫服再服

成無已曰桔梗辛溫以散寒甘草味甘平以除熱
甘梗相合以調寒熱

猪膚湯

猪膚

一斤
甘寒

右一味以水二斗煮取五升去滓

加白蜜一升白粉五合漿香和相得溫二服

成無已曰。猪水畜也。其氣先入腎。少陰客熱。是以猪膚解之。加白蜜以潤燥。除煩。白粉以益氣。斷利。

苦酒湯

半夏洗破如棗核大十四枚 辛溫

雞子一枚去黃內上 苦酒

中甘微寒 右二味。內半夏。著苦酒中。以雞子

殼置刀鋸中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。

不差。更作三劑服之。

成無已曰。辛以散之。半夏之辛。以發音聲。甘以緩之。雞子之甘。以緩咽痛。酸以收之。苦酒之酸。以飲咽。

半夏散及湯

半夏洗辛

桂枝去皮辛熱

甘草炙甘平以土各等分

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散一兩方寸匕更煎三沸下火冷少少與之。

成無已曰內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦。半夏桂枝之辛以散經寒甘苦之甘以緩正氣。

燒視散

右取婦人中視近隱處剪燒灰以水和服方寸

七日三服小便即利陰功後無所遺婦人病取
男子視襦燒灰

三七八三八七三九十八四十一八四二三八四三
 五四四十六四五
 九四四十六四五

傷寒例第三

自首條至末條 具載傷寒例貳條

辨瘧濕腸脈證第四

二四八三六三六四六五五六七八八九
 十一九十二九十三九十四九十五
 十一九十二九十三九十四九十五

辨太陽病脈證并治上第五

二九十三又九三三九四四又九四〇五又九六又九五
 七又九八又九十九又九十九又九十九又九十九又九十九
 七又九八又九十九又九十九又九十九又九十九又九十九

十三	三百	十四	五百	十五	八百	十六	又九百	十七	又九百	十八	又九百
十九	三百	二十	六百	二十一	三百	二十二	四百	二十三	三百	二十四	三百
二四	二百	二五	二百	二六	二百	二七	二百	二八	二百	二九	二百
二九	二百	三十	二百								

辨太陽脉證并治中第六

二五	四百	二六	四百	二七	又九百	二八	二百	二九	二百	三十	二百
九	五百	十	二百	十一	二百	十二	二百	十三	二百	十四	八百
十五	四百	十六	又九百	十七	又九百	十八	又九百	十九	又九百	二十	又九百
二五	四百	二六	四百	二七	又九百	二八	二百	二九	二百	三十	二百

修身書劍傳

十百九
三二
二五
三二
四二
三三
三三
五三

五百五
三六
四九
三七
一五
三八
二六
三九

十百二
四一
八二
四二
二五
四三
六二
四四

五十三
四六
二四
七五
中二
四八
五二
四九

前五十
十九
五一
八五
二九
八五
三九
五四

九百五
八十一
五六
九十五
七二
十二
五八
五九

三六十三
二六
六一
十六
二九
十六
三六
六四

九百六
百四
六六
四六
七五
六八
二六
六九

七十三
四七
二五
七二
三三
七三
二七
七四

七五
四七
六一
四七
三一
七八
三三
七九

一百四	九十五	九十	八十五	八十
三百一	四百四	三百四	三百八	三百三
五百一	六百三	五百四	六百二	五百八
七百二	八百七	七百九	八百七	八百二
九百二	九百八	九百五	九百四	九百三
九百九	九百九	九百四	九百九	九百四

辨太陽脉證并治下第七

二十七	二十七	二十七	二十七	二十七
三百七	三百七	三百七	三百七	三百七
五百七	五百七	五百七	五百七	五百七
七百七	七百七	七百七	七百七	七百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七
九百七	九百七	九百七	九百七	九百七

二三八
一百八
二四
八百四
二五
九百七
二六
一百八
二七
一百八

二八
三百八
二九
七百五
三十
八百八
三一
一百六
三二
五百九

三三
五百八
三四
五百三
三五
九百五
三六
一百一
三七
四百八

三八
七百三
三九
八百七
四十
二百八
四一
二百一
四二
二百二

四三
三百九
四四
三百四
四五
二百七
四六
二百一
四七
三百四

四八
三百四
四九
二百九
五十
三百五
五十一
見後方

辨陽明脉證并治第八

三八
三百六
三九
三百四
四十
二百五
四一
二百六
四二
二百七

四八
二百九
四九
二百七
五十
二百三
五十一
二百五

五二
二百四
五三
二百五
五四
二百六
五五
二百七

五八
二百九
五九
二百七
六十
二百三
六十一
二百五

十八百三十九三百一十四三百三十一三百三十三

三十三百二十九百九百二十五百二十六百二十七百

八十三百二十九百六十五百三十九百三十一百三十三

三十三百三十四百八十三百三十五百三十三百三十六百

八十三百三十九百八十四百三十三百四十一百四十二百

三十三百四十四百九百四十五百六前五百四十六百

五十四百六前四百九百六後五百七十三百五十三百

六五三百六前四百九百六後五百七十三百五十三百

一五三百五前四百九百六後五百七十三百五十三百

四五三百五前四百九百六後五百七十三百五十三百

八十三百六十四百七十九百六十五百五十六百六十七百

辨少陰病脈證并治第十一

[illegible]

辨厥陰病脈證并治第十二

四	四	四	四	二	四	前	二	後	十	十	二	一
四	四	四	四	八	百	二	三	四	九	三	八	六
四	四	四	四	三	百	七	四	百	十	四	十	四
四	四	四	四	二	百	二	後	百	八	百	三	五
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	八	八
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	五
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	六
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	七
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	八
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	九
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十一
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十二
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十三
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十四
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十五
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十六
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十七
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十八
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	十九
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十一
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十二
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十三
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十四
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十五
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十六
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十七
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十八
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	二十九
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十一
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十二
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十三
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十四
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十五
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十六
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十七
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十八
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	三十九
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四十
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四十一
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四十二
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四十三
四	四	四	四	三	百	二	百	三	十	四	七	四十四
四	四	四	四	三	百							

二	三	百	五
二	四	一	五
二	五	二	五
二	六	三	五
二	七	四	五

辨不可下病脉證并治第二十

二	八	五	百
二	九	十	五
三	十	十一	五
三	十一	十二	五
三	十二	十三	五

三	三	五	百
三	四	十六	五
三	五	十七	五
三	六	十八	五
三	七	十九	五

二	八	七	五
二	九	八	五
二	十	九	五
二	十一	十	五
二	十二	十一	五

四	三	五	百
四	四	十六	五
四	五	十七	五
四	六	十八	五
四	七	十九	五

五	百
五	十一
五	十二
五	十三
五	十四

辨可下病脉證并治第二十一

五	一	二	五
五	二	三	五
五	三	四	五
五	四	五	五
五	五	六	五

五	六	七	五
五	七	八	五
五	八	九	五
五	九	十	五
五	十	十一	五

易經論脈證并治
原本編次
七

六一三五八

附傷寒論條辨編次

欽方有執中行甫條辨

辨太陽病脉證并治上篇第一 凡六十六條

一 九十三 又九十三 三 九九 四 九九 五 一百一十六 一百一十七 一百一十八 又九十九

六 九十 又九十九 十一 八九 十二 一百一十四 十三 一百一十五 十四 一百一十六 十五 一百一十七

五 二百一十六 四 一百一十七 十八 一百一十九 十九 一百一十 二十 一百一十一 二十一 一百一十二

六 二百一十三 三 一百一十四 二十二 一百一十五 二十三 一百一十六 二十四 一百一十七 二十五 一百一十八

九 二百一十五 二 一百一十六 二十七 一百一十七 二十八 一百一十八 二十九 一百一十九 三十 一百二十

十 二百一十三 三 一百一十四 三十一 一百一十五 三十二 一百一十六 三十三 一百一十七 三十四 一百一十八

九 二百一十六 六 一百一十七 三十五 一百一十八 三十六 一百一十九 三十七 一百二十 三十八 一百二十一

三 一百一十六 七 一百一十七 三十九 一百一十八 四十 一百一十九 四十一 一百二十 四十二 一百二十一

原本編次

三十四百二十五
三十五百二十六
三十六百三十七
三十七百五十八

一六	二六	三六	四六	五六	六六	七六	八六	九六	一〇六
九	二	三	四	五	六	七	八	九	一〇
龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯	龍湯
作大	作大	作大	作大	作大	作大	作大	作大	作大	作大
青龍	青龍	青龍	青龍	青龍	青龍	青龍	青龍	青龍	青龍
湯	湯	湯	湯	湯	湯	湯	湯	湯	湯
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
五	五	五	五	五	五	五	五	五	五
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
七	七	七	七	七	七	七	七	七	七
八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇

辨陽明病脉證并治第四

一六
二六
三六
四六
五六
六六
七六
八六
九六
一〇六

六	八	三	八	三	八	三	八	三	五	四
百	百	五	六	八	九	八	七	四	二	八
五	四	六	四	六	十	一	一	八	九	三
四	九	四	三	三	三	二	十	十	後	百
八	一	五	五	七	六	八	七	九	二	三
百	百	二	百	二	二	二	二	二	二	九
五	五	七	四	三	三	二	三	十	四	二
五	十	四	十	五	十	五	十	五	十	百
三	九	九	八	六	六	八	七	九	二	十
百	百	二	百	三	八	三	五	百	七	百
五	五	九	四	四	三	三	三	十	十	百
六	一	四	一	六	一	六	二	六	二	十
四	三	五	三	二	八	八	七	六	十	三
百	百	二	百	九	百	八	六	六	九	百
五	五	四	四	三	四	三	三	十	下	百
七	二	四	二	七	二	七	二	七	七	下
十	八	五	五	九	八	七	七	七	二	二
三	五	八	五	一	七	九	四	十	七	百
百	百	百	百	百	百	百	百	百	百	百
五	五	八	四	三	三	三	三	十	十	十
六	三	四	四	三	三	三	三	十	十	十

卷之四

辨少陽病脈證并治第五 九九條

辨太陰病脈證并治第六 凡九條

六	五	一
八	三	三
五	二	百
七	百	二
九	九	三
六	九	百
十	百	三
	五	三
	四	百
	四	三
	三	百
	五	三
	五	百
	八	百
	六	三
	五	百
	五	百
	七	三
	百	

辨少陰病脉證并治第七 凡四十六條

四	三	三	八	三	六	三	九	三	五	四	九	六	一
百	四	三	三	三	六	三	二	三	百	百	八	六	三
四	四	後	八	二	一	二	四	十	十	十	六	三	二
七	三	三	三	七	四	三	一	六	三	三	六	六	三
十	百	四	三	三	七	三	百	七	百	七	八	三	百
四	五	五	四	十	三	十	二	五	十	十	七	三	七
八	三	三	五	八	三	八	三	九	六	三	八	三	一
四	六	六	七	三	六	二	六	二	八	百	八	百	四
七	三	一	六	三	七	九	三	三	九	三	八	三	七
二	百	八	三	二	九	五	百	二	十	百	九	百	五
		五	三	七	二	二	三	二	七	三	二	六	三
		三	七	三	七	三	六	三	九	一	四	四	二
		七	七	三	八	二	三	八	十	百	百	七	三
		百	百	三	三	三	百	三	八				百

辨少陰病脉證并治第七 凡四十六條

辨厥陰病脉證并治第八 凡五十四條

四 二 三 四 七 百 四 三 三 八 四 百 四 四 四 三 百 四 五 四 四 四 六 四 七	三 七 三 四 九 百 三 八 四 百 三 九 四 百 一 四 十 四 百 二 四 一 三 四 百 五	三 二 三 四 六 百 三 三 四 百 三 四 四 百 六 三 五 四 百 九 三 六 四 百 十	二 七 二 四 四 百 二 八 二 四 百 二 九 二 四 百 八 三 十 二 四 百 九 三 一 四 百 三	二 二 三 四 一 百 二 三 四 百 二 四 二 四 百 五 二 五 二 四 百 六 二 六 三 四 百 二	四 百 十 八 二 四 百 又 十 九 二 四 百 一 二 十 二 四 百 一 又 二 一 二 四 百 二	十 三 十 四 百 一 十 四 四 百 七 十 五 九 百 十 十 六 九 百 十 十 七	二 八 十 四 百 九 四 百 十 五 十 四 百 十 二 十 四 百 八 十 二 四 百	一 四 百 二 四 百 五 八 三 四 百 五 九 四 百 七 五 九 四 百 六 十 四 百 七 四
---	--	---	--	--	---	---	---	--

四七四百八四八四百五四九四百一五十一四百五五十二四百

五二四百三五三四百四五四四百五五五四百七

辨溫病風溫雜病脈證并治第九 凡二十條

一又九三百七二三百九三三百一四三百七五三百六六三百二七三百七

八三百九九三百一十三百六十一三百七十二三百七十三三百三十四三百二

十五三百五十六三百七十七三百七十八三百九十九三百八

二十三百五又九

辨霍亂脈治第十 凡九條

一四百六二四百六三四百四四四百六五四百六六四百六七四百六

八四百六九四百七

彭家論脈象 條辨編次 止

辨陰陽易差後勞復脈證并治第六 凡七條

一 四百一十七 二 四百一十七 三 四百一十七 四 四百一十七 五 四百一十七 六 四百一十七 七 四百一十七

七七

辨瘧濕弱病證第十二 凡十六條

一 四百一十七 二 四百一十七 三 四百一十七 四 四百一十七 五 四百一十七 六 四百一十七 七 四百一十七 八 四百一十七 九 四百一十七 十 四百一十七 十一 四百一十七 十二 四百一十七 十三 四百一十七 十四 四百一十七 十五 四百一十七 十六 四百一十七

一 四百一十七 二 四百一十七 三 四百一十七 四 四百一十七 五 四百一十七 六 四百一十七 七 四百一十七 八 四百一十七 九 四百一十七 十 四百一十七 十一 四百一十七 十二 四百一十七 十三 四百一十七 十四 四百一十七 十五 四百一十七 十六 四百一十七 十七 四百一十七 十八 四百一十七 十九 四百一十七 二十 四百一十七 二十一 四百一十七 二十二 四百一十七 二十三 四百一十七 二十四 四百一十七 二十五 四百一十七 二十六 四百一十七 二十七 四百一十七 二十八 四百一十七 二十九 四百一十七 三十 四百一十七 三十一 四百一十七 三十二 四百一十七 三十三 四百一十七 三十四 四百一十七 三十五 四百一十七 三十六 四百一十七 三十七 四百一十七 三十八 四百一十七 三十九 四百一十七 四十 四百一十七 四十一 四百一十七 四十二 四百一十七 四十三 四百一十七 四十四 四百一十七 四十五 四百一十七 四十六 四百一十七 四十七 四百一十七 四十八 四百一十七 四十九 四百一十七 五十 四百一十七 五十一 四百一十七 五十二 四百一十七 五十三 四百一十七 五十四 四百一十七 五十五 四百一十七 五十六 四百一十七 五十七 四百一十七 五十八 四百一十七 五十九 四百一十七 六十 四百一十七 六十一 四百一十七 六十二 四百一十七 六十三 四百一十七 六十四 四百一十七 六十五 四百一十七 六十六 四百一十七 六十七 四百一十七 六十八 四百一十七 六十九 四百一十七 七十 四百一十七 七十一 四百一十七 七十二 四百一十七 七十三 四百一十七 七十四 四百一十七 七十五 四百一十七 七十六 四百一十七 七十七 四百一十七 七十八 四百一十七 七十九 四百一十七 八十 四百一十七 八十一 四百一十七 八十二 四百一十七 八十三 四百一十七 八十四 四百一十七 八十五 四百一十七 八十六 四百一十七 八十七 四百一十七 八十八 四百一十七 八十九 四百一十七 九十 四百一十七 九十一 四百一十七 九十二 四百一十七 九十三 四百一十七 九十四 四百一十七 九十五 四百一十七 九十六 四百一十七 九十七 四百一十七 九十八 四百一十七 九十九 四百一十七 一百 四百一十七

附傷寒論尚論篇編次

西昌喻昌嘉言甫著

太陽經上篇凡風傷衛之證列于此篇

二十九三又九三九十四四又九五九十五六又九七九

八又九九百一十百一十一百一十二百一十三百一十四百一十五百一

十六百一十七百一十八百一十九百一二十百一二十一百一二十二百一

二十三百一二十四百一二十五百一二十六百一二十七百一二十八百一二十九百一

三十百一三十一百一三十二百一三十三百一三十四百一三十五百一三十六百一

三十七百一三十八百一三十九百一四十百一四十一百一四十二百一四十三百一

四十四百一四十五百一四十六百一四十七百一四十八百一四十九百一五十百一

五十一百一五十二百一五十三百一五十四百一五十五百一五十六百一五十七百一

卷之四
三

五
九
百
二
四
二
前
二
百
三
四
二
後
五
又
九
四
三
百
四
四
四
百

七
四
五
百
四
四
六
七
百
六
四
七
百
八
四
八
百
六
四
九
百

十
五
十
百
七
五
一
四
百
七
五
二
五
百
七
五
三
九
百
七

太陽經中篇
凡寒傷營之證列於此篇

二
九
十
三
百
十
三
九
又
九
四
四
百
五
四
百
六
百
四
百
七

又
百
八
十
九
百
二
十
五
百
一
十
二
百
十
二
百
十
三

百
十
四
百
十
五
百
二
十
六
百
二
十
七
百
二
十
八

百
二
十
九
百
五
二
一
三
十
百
五
二
百
二
百
二
百
二

五
三
三
百
五
三
四
百
五
二
五
百
五
一
六
百
五
二
七
百
五

七
三
八
百
八
三
九
百
十
三
十
百
八
三
二
百
八
三
二
百
八

九(八)二百九(九)六十合病

一(四)二百三(三)二百三(七)四(二)百(五)四十併病

二(六)又九(三)三百以上

一(七)百三(二)百十三(三)四百以上
九(七)併病

太陰經全篇

一(五)三百二(二)三百五(九)三百五(四)三百三(五)三百五(八)三百五(七)三百

六(八)三百五(七)九(六)十

少陰經前篇

一(六)三百二(三)三百三(七)三百三(六)三百四(七)三百五(六)三百六(五)三百七(四)三百

八(八)三百八(九)三百九(八)三百十(七)三百十一(六)三百十二(五)三百十三(四)三百

卷之八

少陰經前篇

[illegible]

差後勞復陰陽易病

七四
一頁

[illegible]